

Памятка экстренной профилактики ВИЧ-инфекции

Для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции должна быть укомплектована аптечка:

- 70% спирт- 100 мл (для обработки кожных покровов, полости горла и рта)
- 5% р - р йода (для обработки раневой поверхности)
- ватные и марлевые тампоны (ватные палочки) - по 5 штук
- напальчники - 5 штук,
- бинт марлевый медицинский стерильный (5мм. х 10 см.) -2 шт.
- лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х7,2 см.)- 3 шт.
- салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см. х 14см, № 10) - 1 упак.
- ножницы

Аварийная ситуация	Действия персонала
При проколе (пореze)	1. немедленно снять перчатки 2. вымыть руки с мылом под проточной водой 3. обработать 70% спиртом 4. смазать ранку 5% спиртовым р-ром йода 5. лейкопластырь
При пропадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы	1. обработать 70% спиртом 2. обмыть водой с мылом 3. повторно 70% спиртом
При попадании биологической жидкости на слизистую глаз, носа, рта	Рот и горло прополаскивают большим количеством воды, затем 70% раствором этилового спирта Слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой НЕ ТЕРЕТЬ!
При пропадании крови или других биологических жидкостей на рабочую одежду	Снять и погрузить в дезинфицирующий р-р
При попадании биологической жидкости на пол (бой пробирки)	Место накрыть ветошью, обильно смоченной в дез. р-ре (экспозиция 1 час) все собрать и вместе с ветошью поместить в емкость для обработки ветоши. Повторно накрыть место аварии ветошью с дез. р-м (экспозиция 1час) Произвести уборку кабинета по типу генеральной. Использовать средства СИЗ

СОСТАВ АВАРИЙНОЙ АПТЕЧКИ (АПТЕЧКА АНТИ-СПИД)

В настоящее время нет единого стандарта содержимого аптечки антивич. Каждое учреждение регулирует перечень средств, исходя из особенностей своей работы.

Можно приобрести эти средства в аптеке и сложить в пластиковый контейнер с крышкой, а можно воспользоваться готовым решением.